

## SENSOCID

**SENSOCID gel topico 30ml**

**SENSOCID dentifricio 50 ml**

### Caratteristiche

Il fenomeno della sensibilità dentinale rappresenta una delle problematiche più diffuse a livello della cavità orale. Si ritiene che tutta la popolazione, in maniera cronica oppure anche solo a seguito di singoli eventi predisponenti, soffra o abbia sofferto di questa manifestazione dolorosa.

In particolare, la sensibilità dentinale è definita come un "dolore acuto e di breve durata che insorge a livello della dentina radicolare in risposta a stimoli termici, chimici, osmotici o tattili".

Per un trattamento intensivo nel caso di ipersensibilità acuta, intensa:

SENSOCID gel topico 30ml  
e SENSOCID dentifricio 50 ml

### SENSOCID Gel Topico 30 ml

#### Indicazioni

Treatmento della sensibilità dentinale in seguito all'esposizione della dentina dovuta ad erosioni o abrasioni dello smalto, recessioni gengivali con esposizione della giunzione smalto-cemento, dopo trattamenti sbiancanti, dopo igiene orale professionale, dopo chirurgia periodontale.

#### Modalità d'uso

Applicare il gel, su uno spazzolino morbido, e massaggiare delicatamente per 15/30 secondi insistendo sulle zone

particolarmente interessate dalla sintomatologia dolorosa. Non risciacquare il cavo orale e non assumere cibi o bevande per almeno 30 minuti dopo l'applicazione. E' consigliabile l'uso per una settimana con un'applicazione giornaliera dopo igiene orale.

#### Composizione

Cloruro di stronzio, Potassio citrato, Fluoruro di Potassio, Cetilpiridinio cloruro.

#### Confezione

1 tubo da 30 ml.

### SENSOCID dentifricio 50 ml

#### Indicazioni

Utilizzare ogni qual volta che la comparsa del dolore sia causata da sensibilità. E' consigliabile l'uso per 15 giorni, anche dopo la scomparsa della sensazione dolorosa. A scopo preventivo in soggetti predisposti, e dopo consiglio dell'odontoiatra, il trattamento può essere continuato.

#### Modalità d'uso

Lavarsi i denti almeno due volte al giorno con Sensocid dentifricio, in sostituzione del dentifricio abituale. Limitare l'assunzione di

cibo e bevande almeno per i 30 minuti successivi all'uso del Gel Dentifricio.

#### Composizione

Cloruro di stronzio, Potassio citrato, Fluoruro di Potassio, Cetilpiridinio cloruro.

#### Confezione

n. 1 tubo da 50 ml.

