

GELGUM

GEL COLLUTORIO SPRAY

Caratteristiche

Gel

Il prodotto di facile applicazione, è dotato di proprietà mucoadesive che permettono di applicarlo a protezione delle lesioni della mucosa orale svolgendo un'azione antibatterica (clorexidina digluconato), analgesica (mirra) e antinfiammatoria (acido β -glicirretico).

Collutorio

Il prodotto è indicato per lesioni diffuse, estese o posizionate nella parte posteriore della bocca.

Ha le stesse caratteristiche protettive, antibatteriche, analgesiche e antinfiammatorie del gel.

Consigliato l'uso dopo l'igiene orale.

Spray

Il prodotto è utile per lesioni singole (azione mirata) e diffuse.

E' pratico da usare fuori casa. ha le stesse caratteristiche protettive, antibatteriche, analgesiche e antinfiammatorie del gel e del collutorio.

Indicazioni

Gel, collutorio, spray

Gel Gum è indicato nei trattamenti

- delle afte e stomatiti afose delle mucositi orali
- gengiviti e parodontiti
- ulcere (virali, da trauma e morsicature, da protesi e apparecchi ortodontici), irritazioni termiche e chimiche,
- dopo chirurgia orale

Modalità d'uso

Gel

Afte, ulcere:

Applicare il gel direttamente sulle

lesioni con batuffolo di cotone o con la punta del dito.

Massaggiare il prodotto per qualche secondo. Non bere o mangiare per almeno 30 minuti.

Continuare il trattamento per due giorni dopo la completa guarigione

Lesioni da protesi

Distribuire il gel, in strato sottile, sopra la protesi in corrispondenza delle lesioni sulla mucosa orale, prima dell'inserimento. Non bere o mangiare per almeno 30 minuti.

Chirurgia dentale:

utilizzare secondo le indicazioni del dentista

Collutorio

Mucositi e gengiviti

Sciogliere la bocca con circa 10 ml di prodotto per 1 minuto, due volte al giorno per 1/2 settimane secondo indicazioni del dentista.

Non bere o mangiare per almeno 30 minuti.

Spray

Afte, ulcere

Spruzzare la soluzione direttamente sulle lesioni. Non bere o mangiare per almeno 30 minuti. Continuare il trattamento per due giorni dopo la completa guarigione.

Lesioni da protesi

Spruzzare la soluzione, sopra la protesi in corrispondenza delle lesioni sulla mucosa orale, prima dell'inserimento. Non bere o mangiare per almeno 30 minuti.

Chirurgia dentale

utilizzare secondo le indicazioni del dentista

Composizione

(Principi attivi)

Clorexidina digluconato al 0,2%, Mirra estratto fluido, idrossietilcellulosa.

Confezione

Gel: tubo da 15g.

Collutorio: Flacone da 200ml,

Flacone da 1Lt in scatola da 6 pz con 2 pompe dosatrici

Spray: Flacone da 30ml.

PATENT PENDING

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I

CE 0373

