

SENSOCID

SENSOCID gel topico 30ml

SENSOCID dentifricio 50 ml

Caratteristiche

Il fenomeno della sensibilità dentinale rappresenta una delle problematiche più diffuse a livello della cavità orale. Si ritiene che tutta la popolazione, in maniera cronica oppure anche solo a seguito di singoli eventi predisponenti, soffra o abbia sofferto di questa manifestazione dolorosa.

In particolare, la sensibilità dentinale è definita come un "dolore acuto e di breve durata che insorge a livello della dentina radicolare in risposta a stimoli termici, chimici, osmotici o tattili".

Per un trattamento intensivo nel caso di ipersensibilità acuta, intensa:

SENSOCID gel topico 30ml
e SENSOCID dentifricio 50 ml

SENSOCID Gel Topico 30 ml

Indicazioni

Treatmento della sensibilità dentinale in seguito all'esposizione della dentina dovuta ad erosioni o abrasioni dello smalto, recessioni gengivali con esposizione della giunzione smalto-cemento, dopo trattamenti sbiancanti, dopo igiene orale professionale, dopo chirurgia periodontale.

Modalità d'uso

Applicare il gel, su uno spazzolino morbido, e massaggiare delicatamente per 15/30 secondi insistendo sulle zone

particolarmente interessate dalla sintomatologia dolorosa. Non risciacquare il cavo orale e non assumere cibi o bevande per almeno 30 minuti dopo l'applicazione. E' consigliabile l'uso per una settimana con un'applicazione giornaliera dopo igiene orale.

Composizione

Cloruro di stronzio, Potassio citrato, Fluoruro di Potassio, Cetilpiridinio cloruro.

Confezione

1 tubo da 30 ml.

SENSOCID dentifricio 50 ml

Indicazioni

Utilizzare ogni qual volta che la comparsa del dolore sia causata da sensibilità. E' consigliabile l'uso per 15 giorni, anche dopo la scomparsa della sensazione dolorosa. A scopo preventivo in soggetti predisposti, e dopo consiglio dell'odontoiatra, il trattamento può essere continuato.

Modalità d'uso

Lavarsi i denti almeno due volte al giorno con Sensocid dentifricio, in sostituzione del dentifricio abituale. Limitare l'assunzione di

cibo e bevande almeno per i 30 minuti successivi all'uso del Gel Dentifricio.

Composizione

Cloruro di stronzio, Potassio citrato, Fluoruro di Potassio, Cetilpiridinio cloruro.

Confezione

n. 1 tubo da 50 ml.

